



# POST-TEST

## LES SYMPTÔMES COMPORTEMENTAUX ET PSYCHOLOGIQUES DE LA DÉMENCE

POUR VOTRE PADPC-FMQQ

1.

**LE CHOIX D'UNE INTERVENTION NON PHARMACOLOGIQUE CONTRE LES SYMPTÔMES NEUROPSYCHIATRIQUES REPOSE SUR TOUS LES CRITÈRES SUIVANTS, SAUF UN. LEQUEL ?**

- A L'histoire de vie
- B Les causes repérées
- C La routine de l'établissement
- D L'applicabilité dans le milieu

2.

**QUELLE CLASSE DE MÉDICAMENT S'EST AVÉRÉE LA PLUS UTILE POUR CONTRER L'AGITATION ET L'AGRESSIVITÉ IMPORTANTES CHEZ LE PATIENT SOUFFRANT DE TROUBLES NEUROCOGNITIFS ?**

- A Les antipsychotiques
- B Les benzodiazépines
- C Les stabilisateurs de l'humeur
- D Les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase

3.

**LEQUEL DES ÉLÉMENTS SUIVANTS FAIT PENCHER LA BALANCE VERS UNE DÉPRESSION PLUTÔT QUE VERS L'APATHIE ?**

- A Un manque d'initiative pour les activités quotidiennes
- B De l'irritabilité et des pleurs au quotidien
- C Une absence de réactivité émotionnelle aux événements
- D Une fluctuation de la vigilance et de l'affect

4.

**QUEL EST LE TRAITEMENT PRIVILÉGIÉ EN CAS DE DÉPRESSION GRAVE CHEZ UNE PERSONNE SOUFFRANT DE LA MALADIE D'ALZHEIMER ?**

- A Une psychothérapie cognitivocomportementale
- B Une thérapie par stimulation neurosensorielle comme la thérapie Snoezelen
- C Le citalopram seul
- D Une thérapie de la réminiscence et un antidépresseur

5.

**QUELLE ACTION EST-IL IMPORTANT D'EFFECTUER LORS DE L'INTERVENTION AUPRÈS D'UNE PERSONNE ÂGÉE QUI CRIE ?**

- A Prescrire un médicament psychotrope
- B Trouver en équipe des interventions personnalisées
- C Suivre un protocole standardisé
- D Ignorer la personne, car crier est inévitable dans la maladie d'Alzheimer

6.

**PARTI DES RAISONS DE CRIER SUIVANTES, LAQUELLE NE S'APPLIQUE PAS À UNE PERSONNE ÂGÉE AYANT DES TROUBLES COGNITIFS ?**

- A Douleur
- B Anxiété
- C Tentative de manipuler les soignants
- D Vulnérabilité

Les réponses seront publiées dans trois mois dans le numéro de juin 2016.



## POST-TEST

### LES SYMPTÔMES COMPORTEMENTAUX ET PSYCHOLOGIQUES DE LA DÉMENCE (suite)

POUR VOTRE PADPC-FMOQ

7.

TOUS LES MÉDICAMENTS SUIVANTS SE SONT RÉVÉLÉS EFFICACES DANS LE TRAITEMENT DE LA DÉPRESSION PARKINSONNIENNE, SAUF UN. LEQUEL ?

- A Le pramipexole
- B La désipramine
- C La nortriptyline
- D Le citalopram

8.

LEQUEL DES ANTIPSYCHOTIQUES SUIVANTS PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR TRAITER LA PSYCHOSE DE LA MALADIE DE PARKINSON ?

- A L'olanzapine
- B La rispéridone
- C La clozapine
- D L'aripiprazole

9.

Parmi les éléments suivants, lequel n'est pas un critère diagnostique de la variante comportementale des démences frontotemporales ?

- A Apathie, inertie précoce
- B Changement de comportement alimentaire
- C Trouble de l'orientation précoce
- D Perte d'empathie et de sympathie précoce

10.

QUEL MÉDICAMENT EST LE PLUS EFFICACE DANS LE TRAITEMENT DE LA VARIANTE COMPORTEMENTALE DES DÉMENCES FRONTOTEMPORALES ?


- A Citalopram
- B Mémantine
- C Donépézil
- D Galantamine

## SOYEZ BRANCHÉS !



**LEMEDECINDUQUEBEC.ORG** ▶

REMPLISSEZ VOTRE POST-TEST EN LIGNE,  
C'EST FACILE ET RAPIDE !

1. Allez sur [lemedecinduquebec.org](http://lemedecinduquebec.org).
2. Cliquez sur l'onglet Post-test en haut de la page.
3. Connectez-vous en utilisant votre mot de passe  
 activez votre profil d'utilisateur.
4. Remplissez le post-test correspondant et obtenez votre

- résultat immédiatement. La FMOQ vous attribuera trois heures de crédits de catégorie 1 qui seront automatiquement ajoutées à votre PADPC-FMOQ si vous obtenez une note minimale de 60 %. **Répondez avant le 1<sup>er</sup> juin 2016.**
5. Votez pour votre article Coup de cœur du mois.

#### RÉPONSES DU POST-TEST DE DÉCEMBRE 2015 :

1. b 2. c 3. d 4. b 5. d 6. c 7. c 8. e 9. c 10. En raison d'une formulation erronée, cette question a été retirée.

*Félicitations aux 1168 médecins qui ont obtenu trois heures de crédits de catégorie 1 en répondant au post-test de novembre 2015 !*