



## LES DOULEURS ABDOMINALES AIGUËS

POUR VOTRE PADPC-FMOQ

1.

POUR LEQUEL DES PROBLÈMES SUIVANTS L'ÉCHOGRAPHIE CIBLÉE A LA PLUS GRANDE SENSIBILITÉ ET SPÉCIFICITÉ ?

- A Hydronéphrose
- B Anévrisme de l'aorte
- C Cholécystite
- D Grossesse ectopique

2.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE FORMATION DE BASE EN ÉCHOGRAPHIE CIBLÉE ET LA FORMATION POUR DEVENIR PRATICIEN AUTONOME (NIVEAU 3) ?

- A Dépister des maladies dangereuses
- B Accélérer la prise en charge des maladies dangereuses
- C Éliminer des maladies dangereuses
- D Confirmer des maladies dangereuses

3.

EN CE QUI A TRAIT À LA DOULEUR ABDOMINALE AIGUË CHEZ L'ENFANT ET LE NOUVEAU-NÉ, LAQUELLE DE CES AFFIRMATIONS EST VRAIE ?

- A L'appendicite se présente de façon caractéristique et non compliquée chez les nourrissons.
- B La solution de réhydratation par voie orale est meilleure que le jus de pomme dilué pour une déshydratation légère.
- C Le soulagement d'une douleur importante peut nécessiter l'utilisation d'opioïdes.
- D Une forte probabilité de malrotation peut être observée à domicile.

4.

TOUTS CES ASPECTS SUIVANTS EXPLIQUENT LA COMPLEXITÉ DE L'ÉVALUATION D'UNE DOULEUR ABDOMINALE CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE, SAUF UN. LEQUEL ?

- A Les troubles cognitifs peuvent parfois teinter l'évolution de la maladie actuelle.
- B Les changements physiologiques liés à l'âge modifient la concordance de l'examen physique.
- C Les médicaments modifient l'interprétation des signes vitaux.
- D Les proches sont rarement utiles pour obtenir une évaluation pertinente.

5.

LEQUEL DE CES ANÉVRISMES EST LE PLUS SUSCEPTIBLE DE SURVENIR PARALLÈLEMENT À UN ANÉVRISME DE L'AORTE ABDOMINALE ?

- A Un anévrisme de l'aorte thoracique
- B Un anévrisme de l'artère fémorale
- C Un anévrisme de l'artère poplitée
- D Le risque est le même pour tous les types d'anévrismes

6.

LE TRAITEMENT INITIAL DE L'ISCHÉMIE MÉSENTÉRIQUE INCLUT TOUTES LES MODALITÉS SUIVANTES, SAUF UNE. LAQUELLE ?

- A La réplétion volémique
- B Le traitement antithrombotique (héparine)
- C Les vasopresseurs
- D La décompression gastrique (tube nasogastrique)



## LES DOULEURS ABDOMINALES AIGÜES (suite)

POUR VOTRE PADPC-FMOQ

7.

QUEL EXAMEN DEMANDER EN CAS DE DOULEUR ABDOMINALE AIGÜE ET DE DIARRHÉE DEPUIS 3 JOURS, QUAND LA TOMODENSITOMÉTRIE MONTRE UNE PANCOLITE D'ALLURE AIGÜE ?

- A Calprotectine fécale
- B Coloscopie
- C Culture de selles
- D Dosage de la protéine C réactive

8.

QUELLE EST LA MEILLEURE OPTION POUR DES CHOLÉLITHIASES SYMPTOMATIQUES ET UNE BILIRUBINÉMIE À 78 µMOL/L ?

- A Cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique
- B Résonance magnétique des voies biliaires
- C Cholécystectomie
- D Échographie endoscopique

9.

QUEL BILAN DEMANDER SI VOUS PENSEZ À UNE PORPHYRIE HÉPATIQUE LORS D'UNE CRISE DE DOULEUR ?

- A Porphobilinogènes et porphyrines urinaires
- B Porphyrines intra-érythrocytaires et urinaires
- C Porphyrines plasmatiques et urinaires
- D Porphyrines fécales et urinaires

10.

QUE SUGGÉRER AU PATIENT EN PREMIER LIEU POUR PRÉVENIR LES MIGRAINES ABDOMINALES ?

- A Anti-inflammatoires non stéroïdiens
- B Traitement non pharmacologique
- C Antidépresseurs tricycliques
- D Bêtabloquants

SOYEZ  
BRANCHÉS !



**LEMEDECINDUQUEBEC.ORG** ▶

POUR OBTENIR VOS CRÉDITS, REMPLISSEZ OBLIGATOIREMENT VOTRE POST-TEST EN LIGNE, C'EST FACILE ET RAPIDE !

1. Allez sur [lemedecinduquebec.org](http://lemedecinduquebec.org).
2. Cliquez sur l'onglet Post-test en haut de la page.
3. Connectez-vous en utilisant votre mot de passe **ou** activez votre profil d'utilisateur.
4. Remplissez le post-test correspondant et obtenez votre résultat immédiatement. La FMOQ vous attribuera trois heures de crédits de catégorie 1 **qui seront automatiquement ajoutées à votre PADPC-FMOQ** si vous obtenez une note minimale de 60%. **Répondez avant le 1<sup>er</sup> février 2022.**
5. Votez pour votre article Coup de cœur du mois.
6. Cliquez sur le bouton « Remplir l'annexe 13 de votre PADPC » et remplissez-la.